

Kontrakt vedr. udtagning af æg (oocytaaspiration/OPU)

Procedure

Udtagning af æg foregår ved, at man fører en nål ind igennem skedevæggen og ind i hoppens æggestok. Jo flere små follikler (ægblærer) hoppen har i sine æggestokke, des større er chancerne for at få flere æg ud. Æggene findes under mikroskop, vaskes og pakkes. I laboratoriet modnes æggene og en sædcelle sprøjtes ind i ægget under mikroskop (ICSI). Herefter placeres det befrugtede æg i et særligt medie og inkubator, der efterligner forholdene i hoppens æggeleder. I løbet af 7-10 dage, kan vi se, om det befrugtede æg har udviklet sig til et embryo. Embryonet kan enten overføres direkte til en synkroniseret rugehoppe eller fryses ned og tøs op, når en egnet rugehoppe er klar.

Sæd

Man kan både bruge frost- og kølesæd. Det er vigtigt, at sæden er på laboratoriet, når ægget er modent. Der bruges kun ét frostsædsstrå, uanset antallet af æg, per ICSI-session. Som oftest kan ét enkelt strå klippes op i ca. 5 doser, således at det samme strå kan bruges til flere ICSI-sessioner med flere hopper.

Hvis du ønsker, at embryonerne skal kunne transporteres over grænsen, skal hoppen have EU godkendt sundhedsstatus, og det samme skal den sæd, der benyttes (der skal foreligge et gældende INTRA certifikat).

Såfremt der foreligger særlige betingelser, for den sæd, der anvendes til ICSI, skal vi understrege, at det er hoppeejers ansvar at sørge for, at alle betingelser er opfyldt.

Det er ligeledes hoppeejers ansvar at have styr på, hvilke krav der stilles til sæden og certifikater herpå, for registrering af ICSI føl i det ønskede avlsforbund.

Risici og ansvar

Ægudtagning

Overordnet set, er risikoen forbundet med ægudtagning meget lille, men som ved enhver anden procedure, kan der opstå komplikationer. De potentielle risici inkluderer, men er ikke begrænset til, udrivninger i endetarmen, større blødninger ind i bughulen, infektion/abscesser i æggestokkene og bughindebetændelse. Disse komplikationer er yderst sjældne, men kan i værste tilfælde være livstruende. Derudover kan sedationen (bedøvelsen), som ved et hvilket som helst andet indgreb, resultere i kolik og enkelte hopper vil opleve let ubehag el. nedstemthed i dagene efter udtagning af æg.

Hvis der skulle opstå komplikationer i forbindelse med udtagning af æg, skal vi informere om, at virksomheden *ikke* har en forsikring, som dækker hestens værdi eller evt. tab af værdi. Udtagning af æg foregår for ejers eget ansvar, og det er derfor vigtigt, at du inden ægudtagningen har taget stilling til, hvorvidt du ønsker denne risiko dækket gennem en forsikring, du selv tegner. VetEmbryo fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne hændelige komplikationer.

Opbevaring af embryoner eller sæd

Opbevaring af nedfrosne embryoner eller sæd, i flydende kvælstof, i vores beholdere, sker for ejers eget ansvar. Beholderne opbevares i aflåste rum, sikret med alarmsystem, men VetEmbryo er ikke erstatningspligtige ved tab eller bortkomst eller ved uforudsete hændelser som fx tyveri el. brand. Vi gør opmærksom på, at VetEmbryo ikke kan forsikre opbevarede embryoner og sæd, og at det er ejers eget ansvar at tegne en forsikring, hvis det ønskes.

Fejl i DNA bestemmelse

Klienten accepterer, at der ved anvendelse af avancerede reproduktionsteknikker følger en meget lille risiko for at der kan opstå fejl, der kan lede til en forkert DNA afstamning på ICSI føllet. Hvis afstamningen i forbindelse med en genetisk analyse af embryonet eller føllet er ukorrekt, og VetEmbryo kan stilles til ansvar for dette, vil et eventuelt erstatningsansvar under alle omstændigheder beløbsmæssigt være begrænset til de af VetEmbryo fakturerede udgifter i forbindelse med ægudtagningen, ICSI og frysning af embryonet/embryonerne.

Drægtighedsscanning

Efter drægtighedsscanning omkring dag 14 i drægtigheden er der i gennemsnit ca. 15% risiko for drægtighedstab. Herudover er der en lille risiko for (ca. 2%), at der kan opstå tvillingedrægtigheder efter overførsel af ét ICSI embryon. Man skal derfor være ekstra varsom med at få udført scanning for foster med hjerteslag, og ved denne scanning være særligt opmærksom på, at der kun er et foster. De fleste forsikringsselskaber kan tegne en fosterforsikring fra dag 45 i drægtigheden.

Efterbehandling

Hoppen behandles med antibiotika og smertestillende efter udtagning af æg. Hoppen kan komme på fold som normalt den efterfølgende dag. Ridning kan genoptages efter ca. 3-5 dage. Vær opmærksom på, at hoppen skal udelukkes fra konsum og der vil være en karenstid på minimum 14 dage i forhold til stævnestart.

Succesrate

I gennemsnit, er der ca. 65% chance for, at hoppen får et embryon efter én ægudtagning. Faktorer så som hoppens alder, antallet af æg, ægkvalitet og sædkvalitet, har betydning for succesraten. Når embryonet overflyttes til en rugheppe, vil ca. 70% af disse udvikle sig til en drægtighed. Statistisk set er der derfor ca. 45% chance for et levende føl efter én ægudtagning.

Priser

Alle opdaterede priser kan findes her på vores hjemmeside: <https://vetembryo.dk/priser>

Betalingsbetingelser

Betaling for ægudtagning, medicin, ICSI, oprensning af sæd og evt. opstaldning skal foreligge, hvis ikke andet er aftalt, når hoppen afhentes. Vi tager imod Dankort, MobilePay eller bankoverførsel. Betaling for frysning af embryoner sendes på en faktura efterfølgende. Betalingsbetingelser fremgår af fakturaen. Vi overfører/udleverer ikke embryoner, hvis der foreligger ubetalte regninger.

Afbud

Ved afbud skal VetEmbryo underrettes *senest* fredag kl.15.00 forinden den reservede tid. Ved senere afbud tillægges et afbudsgebyr på 750 kr. ex. moms.

Opstaldning

Hvis du ønsker din hest opstaldet hos VetEmbryo i en kortere eller længere periode, gør vi opmærksom på, at opstaldningen sker på ejers *eget* ansvar. VetEmbryo kan ikke stilles til ansvar i tilfælde af skader, skrammer eller ulykker, som opstår under opstaldningen. Ejer er forpligtet til at afholde alle udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mv. Hestene står som udgangspunkt opstaldet på dybstrøelse medmindre andet er aftalt. De fodres med hør/wrap og et fuldfoder og hopperne går på fold det meste af dagen. Hvis du ønsker det, er det muligt at medbringe eget foder.

Denne kontrakt fungerer ligeledes som fuldmagt for VetEmbryo til, for hoppeejers regning, at kunne tilkalde dyrlæge i tilfælde af akut sygdom hos hesten.

Sygdom

Vi forventer, at din hest er vaccineret mod stivkrampe inden ankomst. Derudover forventer vi, at du ikke kommer med en hest, der har vist tegn på sygdom de seneste 3 uger.

Hvis du ønsker at tilmelde din hoppe til ægudtagning og ICSI, bedes du udfylde nedenstående info og underskrive blanketten. Den underskrevne blanket returneres til info@vetembryo.dk inden udtagningen.

Jeg garanterer hermed, som underskriver af denne kontrakt, på tro og love, at være den reelle ejer af donor hoppen/hopperne, og hvis ikke der underskrives som ejer, så den autoritet, som handler på ejers ansvar og er i stand til at træffe alle beslutninger vedrørende hesten og dens veterinære pleje. Den underskrivende enhed er fuldt ud ansvarlig for alle udgifter indeholdt i denne kontrakt og skal derved holde VetEmbryo skadesløs for ethvert krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne kontrakt (herunder ethvert krav, der giver en sådan person manglende ret eller autoritet til at underskrive denne kontrakt på vegne af den sande ejer).

Jeg erklærer også, at ovenstående er gennemlæst og forstået.

Jeg er desuden indforstået med, at mine personoplysninger må videregives til hingsteholder, hvis der anvendes sæd fra en kommerciel hingsteholder.

Aftalen her er underlagt dansk ret.

Tilmeldte hopper (navn og ID nr.)	CHR/Besætnings nr.	Ønskede hingste (navn og ID nr.)

Ønsker du dit embryo og overførsel til rugehoppe indberettet til SEGES, Danmark: JA ☐ NEJ ☐

*Hvis du ønsker dit føl registreret i Dansk Varmblod eller et andet dansk forbund under SEGES, skal vi indberette embryoet og overførsel til SEGES.

Ejer- og faktureringsoplysninger		
Navn	Adresse	Telefon nr. og e-mail

Underskrift

Dato